

四庫全書

子部

欽定四庫全書

普濟方卷三百二十

明 周王朱橚 撰

婦人諸疾門

吐血 附論

夫人吐血者皆由臟腑傷損所致夫血者外行於經絡
內榮於臟腑若傷損氣血經絡則虛血行失於常理氣
逆者吐血又怒氣逆甚則嘔血然憂思驚恐內復氣逆
上者皆吐血也

方

生地黄煎 治婦人勞熱至甚吐血不止心神煩躁少

思飲食

生地黄汁

升一

生藕汁

合三

青蒿汁

合三

生薑

取二兩

蜜

四兩

酥

一兩

柴胡

去苗一兩

知母

二兩

雞蘇葉

一兩

右為散與煎藥汁同於銀器中攪令勻漫火煎成膏

收瓷盒中每服半匙以清粥飲調下不計時候

雞蘇散 治婦人吐血心煩昏悶

麥門冬

當歸

八分

雞蘇葉

一兩

阿膠

生地黃

刺薊

各一兩

黃耆

羚羊角屑

茵根

甘草

各半兩

伏龍肝

黃芩

各三分

右為粗末每服四錢水一盞煎至六分去滓溫服用

薑三片如半雞子大同煎

刺薊散

治婦人頭疼壯熱心中煩悶吐血

刺薊

二兩

雞蘇葉

二兩

赤芍藥

麥門冬

二兩

石膏

三兩

赤茯苓

一兩

黃芩

一兩

茵根

一兩

甘草

一兩

微赤判

二兩

微赤判

生乾地黄

二兩

右為散每服四錢水中盪入生薑半分青竹茹一

分煎至六分去滓溫服不計時候

阿膠散 治婦人吐血心神煩熱

阿膠

二分 搗碎
炒黃燥

當歸

三分

犀角屑

三分

黃芩

三分

桂心

三分

雞蘇葉

三分

羚羊角屑

三分

麥門冬

三分

生乾地黄

二兩

甘草

半兩 炙
赤判

右為散每服四錢水中盪入淡竹茹一分生薑半

分煎至六分去滓溫服不計時候

雞蘇散

出大全良方

治虛損氣逆吐血不止

雞蘇葉

黃芩

各一兩

當歸

半兩

赤芍藥

阿膠

二兩

伏龍肝

二兩

刺薊

生地黃

黃耆

各二兩

右為粗末每服四錢薑三片竹茹如彈子大水同煎

此大全良方雞蘇散此多刺薊生地黃黃耆內煎法

多生薑竹茹然治證并分兩全同故法良方而存此

也

麥門冬散

出聖惠方

治婦人心中壅毒吐血煩悶

麥門冬

二兩

生乾地黄

二兩

薺芩

一兩半

犀角屑

一兩

黃芩

川升麻

各一兩

白茅根

三兩半

藍葉

二兩

甘草

一兩

炙微赤剉

右為散每服四錢水一中盞入香豉一百粒淡竹茹

一分生薑半分煎至六分去滓溫服不計時候

伏龍肝

出永類鈴方

治男子婦人五臟結熱吐血衄血並皆

治之

伏龍肝

生地黄

各一兩

竹茹

一兩

芍藥

當歸

黃芩

川芎

桂心

甘草

各二兩

右為呖咀水一斗三升煮竹茹減三升內藥煮取三升分為三服一方無桂又用生葱心塞鼻或因刺著血不止立佳

竹茹

出子言方

治婦人汗血吐血尿血下血

竹茹

二人升

芍藥

桔梗

芎藭

當歸

甘草

桂心

各一兩

乾地黄

四兩

右呖咀以水一斗煮取三升分三服

生地黄散

出濟生
拔萃

諸見血無寒衄血下血吐溺血背熱

屬於熱

生地黄 熟地黄 枸杞子 地骨皮 天門冬

黃耆 芍藥 甘草 黃芩

各等分

右為粗末每服一兩水煎脉微身涼惡風每一兩加

桂半錢

治肌瘦咯血肺痿等疾

出大全
良方

蛤蚧

一雙全者酒
浸一宿頭炒

知母

貝母

去心人參
去蘆

杏仁

去皮尖
麩炒

枇杷葉

去毛
炒

鹿角膠

粉炒

甘草

右各一兩淨秤為末每服三錢水一盞入桑白皮煎

至八分溫服日三夜二

青飲子

出大金
良方

治咯血

青黛

杏仁各等分

右一處同研成膏用黃蠟和作三十餅子每服一餅

子用乾柿半箇夾定以濕紙裹煨合香同嚼粥飲下

無時

治婦人熱毒上攻吐血不止

一錢五神湯
出聖惠方

生藕汁 刺薊 生地黄汁

各三合

生薑汁

半合 白蜜

右和煎三兩沸無時以小盞調炒麩塵一錢服

柴參散

出聖惠方

治婦人卒吐血不止胃心悶痛

紫參

一兩

鹿角膠

一兩

搗研
炒黃燥

青竹茹

一兩

生乾地黄

二兩

羚羊角屑

一兩炒
黃燥

右為散每服二錢新汲水磨生薑調下不計時候

生地黃散

出聖惠方

治婦人心熱壅悶吐血

生乾地黄

一兩半

麥門冬

一兩去心

甘草

半兩炙微赤剉

薺荒

三分

白茅根

二兩剉

藍葉

一兩

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分豆豉一百粒煎至六分去滓溫服不計時候

萊脾湯

出大全良方

治虛勞吐血下血自汗出

甘草

白芍藥

黃耆

各一兩

熟地黄

三兩

右為末每服四錢水酒各一大盞已上煎至七分盞攪去滓只取六分清汁放溫食前服之

女年十四月水不行遂妄行而嘔血諸藥無效察其形
容人肥脉不大不出且用四生丸即安又嘗治一男子
因飽低頭負重吐血諸藥無效亦用四生丸及青餅子
即安更不發僕觀初盧世治吐血不喜用竹茹生地黃
藕汁然亦不可拘泥此說如陽乘於陰血得熱則流散
經水沸溢宜服涼藥以解之大黃犀角生地生艾藕汁
其能無效如陰乘於陽所謂天寒地凍水凝成冰宜服
溫藥以煖之乾薑肉桂豈能無功學者更宜思之可也

已上所論中四生九青餅子各見於後

四生九

出聖惠方

療吐血陽乘於陰血熱妄行宜服此藥

生荷葉 生艾葉 生地黃

右等分爛研丸如雞子大每服一九三盞煎至二盞
去滓溫服無時候經驗方陳氏云先公遊福青靈石
寺見侍者齋罷來侍立見桌子不穩急聲呼叱之當
時即嘔血蓋食飽後破肺也明年再到寺因問去年
嘔血者無恙其主僧答之得四生九服之遂愈因以

屢救人有效

又方

出聖惠方

治婦人吐血百治不差

龍骨

半兩

當歸

三分剉微炒

生乾地黄

一兩

右為細散以生地汁調下二錢不計時候

又方

出聖惠方

青竹茹

一兩

生地黄

二兩切

羚羊角屑

半兩

右以水一大盞半煎至一盞去滓分三服不計時候

又方

出聖惠方

桂心

一兩

阿膠

半兩

炒黃燥

搗碎

生乾地黃

半兩

兩

右為細散每服一錢煎竹茹湯調下不計時候溫服

又方

出聖惠方

治吐血

生地黄

三升

阿膠

二兩

炒

蒲黃

六合

右用水五升煮取三升分三服僕嘗治一人吐血診

其脉肝部弦氣口濡此因怒極而得之遂用蘇合香

丸和雞蘇丸服即效一方為散粥餅調下二錢或煎

乾薑甘草湯與服或四物理中湯亦可服生地黃竹

藕汁

治婦人吐血

出聖驗方

陳槐花

二兩炒

百草

半兩

右為細末每服茅蘆根煎酒調下亦治血崩一方無茅蘆根用鍾紅燒淬酒下

治熱毒吐血經日百治不差者

出聖惠方

地黃汁

半升

生大黃末

一方寸

右煎地黃汁三兩沸調大黃末令勻為三服

又方

出大全良方

治吐血

用桂心末水調方寸七日夜可二十服

又方

出聖惠方

治熱毒吐血

用伏龍肝研令極細每服二錢新汲水調下頻服取效

茅花湯

出聖惠方

用白茅花濃煎飲之立止擣生白茅根取汁一合飲之亦得或取根一握長六寸水煎去滓溫服

又方

出聖
惠方

用生葱心塞鼻即定若因刺着并刀斧所傷血不止

用之立定

又方

出大全
良方

用釜底墨研入鼻中

又方

出聖
良方

用亂髮灰細研以竹管吹入鼻中立止

又方

出聖
惠方

取龍骨末吹入鼻中立止

治一切風并鼻紅吐血腸風血痢及崩中帶下

用牡驢皮煎膠食

療熱甚嘔血者

以犀角地黄湯局方小三黃丸以白茅根煎

治吐血及下血

出本草

以雞蘇莖葉煎取汁飲之

咳嗽

附論

夫婦人咳嗽者由肌體虛外受於寒熱風濕所得也肺為四臟之華蓋內統諸臟之氣外合於皮毛若為寒熱風濕所傷邪氣自皮毛而入於肺中外皆傷故令咳嗽也大抵治咳不可一槩治當以脉息辨之脉浮而弦者起於風濡而弱者起於濕洪而數者起於熱遲而澀者起於寒風者散之濕者燥之熱者涼之寒者溫之虛者補之未有不安者也經曰微寒為嗽寒甚為傷臟古人立方治嗽未有不下溫藥如乾薑桂心細辛之屬

以寒氣入裏非辛甘不能發散以此準之未有內寒而嗽也又曰熱在上焦因咳為肺痿又實為肺癰虛則為肺痿此人其原或血不足或酒色滋味太過或因服利藥重亡津液操氣內氣焚肺金受邪脉數熱咳嗽膿血病至於此亦已危矣古人立方亦用溫藥加建中之屬今人但見發熱咳嗽卒用柴胡鼈甲門冬亭蔕等藥旋踵受弊而不知非可為深戒就使不可進以溫藥必須用此湯丸古之調治無為鹵莽致傷人命經曰人

感於寒則受病微則為咳甚則泄為痛凡咳嗽五臟六腑皆有之惟肺先受邪蓋肺主氣合於皮毛邪初傷外客皮毛故咳為肺病五腑則各因四時受邪六腑傳入五臟所以古言肺病難愈而善卒死者肺為嬌臟怕寒而惡熱故邪氣易傷而難治以世湯散逕過鍼灸不及故也十種咳嗽者肺咳心咳脾咳腎咳肝咳風咳寒咳支飲咳膽厥陰咳華陀所謂五嗽者冷咳嗽氣嗽之嗽飲邪嗽孫真人亦有方治寒毒渥嗽者歷代方論著之

甚詳惟今之所謂勞嗽者無所經見意其華陀所謂邪嗽真人所謂注嗽者是也此病蓋酒色過度勞極傷肺損動經絡其重者咯唾膿血輕者時發時差又有因虛感邪惡之氣且傳症得之或先嘔而後嗽或先咳嗽漸就沉羸此則非特內損肺經又挾邪惡傳症之氣所以特甚病之毒害無過此也真人治症嗽通氣丸方用蜈蚣四節又夜夢與鬼交通及飲食者全用蜈蚣外臺方四滿丸治五嗽亦用蜈蚣遇世名公能推原其旨意卒

用蛤蚧天靈蓋桃柳枝麝香雄黃安息香之類以通神明之藥療之深知古人之意矣又肺中有蟲如蚕令人喉痒而咳嗽湯散逕過鍼灸不及以令口化蟲死即嗽止 夫嗽者感風於皮毛入於腠理寒於肺經所以嗽也潤肺湯散主之有吐而嗽者由茶飲過多停積於胸膈久則成痰使人頭目昏痛精神不爽惡風憎寒此因痰作咳嗽也潤肺湯加半夏食臟物炙嗽有肺受傷也六合湯玉屑丸主之姪娘而嗽者亦同也但急治恐胎墜治之

以前藥攻之然與產後一理又有經產後而暴虛則肺虛客寒房勞之故使肺作其嗽六合湯主之儒門事親論云楊壽之妻病嗽十餘年

闕

麝香湯止

之以半猶不足用止之明日

闕

覺惡心以人參止之二

日稍寧自下藥中

闕

先日病久

嗽藥已經病自然遲解涌後調理數日及止戴人常言涌後有傾悞者有徐悞者有反悶悶心者病來盡如有反熱者不可不下也大抵二日後無不快者若嗽不止

者以冰水解之藥熱則行寒則止

方

潤肺湯 治咳嗽痛喉中鳴

人參

去蘆

杏仁

去皮尖

麻黃

紫苑

洗去皮後炒各半兩

陳皮

浸去穢

桔梗

去蘆炒

阿膠

剉炒令沸燥

甘草

各三錢

貝母

去心炒

右呖咀每服五錢水一盞煎至七分熱服之

橘皮湯 療春冬傷寒秋夏冷濕咳嗽喉中作聲上氣

不得下頭痛

陳皮 紫苑 麻黃去根 杏仁製 當歸 桂心

甘草 黃芩各等分

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至六分去滓熱服

人參散 治婦人肺臟虛冷時有咳嗽不思飲食

人參一兩去蘆頭 細辛半兩 白朮三分 陳皮一兩湯浸去白穢焙

肉桂三分去皴皮 厚朴一兩去粗皮塗生薑汁炙香熟 白茯苓三分

紫苑三分洗去苗土 乾薑三分炮製 桔梗半兩去蘆頭 甘草半兩炙微赤對

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓溫服不拘時候

五味子散 治婦人心胸痰壅時有喘促欬嗽不欲飲

食

五味子

三分

半夏

湯浸七遍去滑

紫苑

洗去苗土

枇杷葉

臧去毛黃各半兩

前胡

去蘆頭

陳橘皮

湯浸七遍去滑各三分

桔梗

半兩去蘆頭

訶梨勒皮

三分

杏仁

半兩去皮尖雙仁麩炒微黃

赤茯苓

二分

枳殼

半兩麩炒微黃去穰

甘草

半兩炙微赤判

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓溫服不計時候

訶梨勒九 治婦人欬嗽不止痰毒壅滯心胸不利咽

喉噎塞

訶梨勒子

三分

貝母

二分

射干

三分

紫苑

浸洗去苗土

桂心

三分

紫蘇子

微炒三分

前胡

三分去蘆頭

桔梗

三分去蘆頭

木通

三分剉

皂夾子仁

二兩微炒

郁李仁

一兩半湯浸去微炒剉研入

右為細末研入郁李仁令勻煉蜜和搗三五百杵九

如梧桐子大每服不計時候以生薑湯下二十九

細辛散 治婦人肺臟虛寒胸中痰滯不欲飲食時復

咳嗽

細辛

洗去苗土

訶梨勒皮

各半兩

附子

一兩炮製去皮臍

桂心

兩半

甘草

半兩炙微赤剉

紫苑

三分洗去苗土

人參

半兩

乾薑

半兩炮製碎剉

陳橘皮

一兩湯浸去白穰焙

半夏

半兩湯浸七遍去滑

右為粗散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓溫服

厚朴散

治婦人體虛感於寒氣時有欬嗽

厚朴

一兩去粗皮生薑汁炙香熟

白茯苓

一兩三分湯浸

桂心

三分

白朮

一兩

訶梨勒皮

三分

陳橘皮

三分湯浸去白穢焙

人參

一兩去蘆頭

細辛

半兩

甘草

一分炙微赤剉

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓溫服不計時候

蘿蔔子丸

出聖惠方

治婦人腹虛上氣欬胸膈痰滯含化

蘿蔔子

一兩微炒

冬瓜子仁

半兩微炒

蘇蘇子仁

半兩兩

桂心

半兩

訶梨勒皮

麥門冬

一兩去心焙

皂莢子仁

半兩微炒

五味子

半兩

甘草

半兩炙
微赤剉

右為細末煉蜜和丸如彈子大不計時候常含一九

燕津

含化貝母

出聖
惠方

治婦人咳嗽不止

貝母

一兩醋
炒微黃

款冬花

二兩

桂心

一兩

百合

一兩

紫苑

一兩洗
去苗土

杏仁

二兩湯浸去尖
雙仁麩炒令黃

木乳

一兩去粗皮
塗醋炙黃

甘草

半兩炙
微赤剉

右為細末研入杏仁令勻煉蜜和搗如彈子大不計

時候常含一九燕津

白英九

出聖惠方

治婦人咳嗽久不止

皂莢

一兩去皮子塗醋炙焦色

五靈脂

一兩已上並兩蜀桑根搗細羅為末

甜天麻

一兩半隔紙炒令紫色別擣如膏

杏仁

一兩半浸去尖雙仁麩炒黃研如膏

右以棗肉及煉子蜜和丸如梧桐子大每服食後紫

蘇子湯下十丸

治婦人欬嗽不止

出聖惠方

露蜂

一兩微炙

貝母

半兩

桂心

半兩

黃明膠

一兩搗碎炒黃燥

甘草

一分炙微赤剉

右為細散每服一錢食後以糯米粥飲調下

木乳散

出聖惠方

治婦人咳嗽久不止

木乳

三兩去粗皮塗酥炙黃

貝母

二兩酥炒微黃

甘草

一兩塗酥炙微赤剉

杏仁

二兩湯浸去皮尖雙仁麤炒令黃

右為散每服一錢生薑橘皮湯調下食後

四蒲丸

出聖良方

治五嗽一氣嗽二飲嗽三熱嗽四冷嗽五

邪嗽

乾薑

桂心

躑躅花

芎藭

紫苑

各二分

人參

鬼督郵

半夏

洗

甘草

炙各一分

蜈蚣

一枚去頭足炙

細辛

一分

芫花根皮

二分

右為細末煉蜜為丸如大豆許每服五丸米飲下日

三未知加至七九八九見效忌羊肉鴿生葱生菜

海藻松菜

四蒲九

出聖惠方

療五嗽一氣嗽二脾嗽三熱嗽四邪嗽五

冷嗽悉皆主之

蜈蚣

二枚炙

芫花

揀五分熬

躑躅

炒

乾薑

芳藟

各四分

人參 細辛

各三分

桂心

四分

右為末煉蜜丸如梧桐子大米飲下一十九日三服
加至十五九忌生葱生菜

金不換散

出聖良方

治諸嗽

鴛粟殼

七錢去項子蜜炙

白朮

一錢

款冬花

一錢

陳皮

一錢去白

黃連

一分半

右剉末作五服水一盞半薑三片烏梅一箇煎至七分溫服治勞嗽神效又黃耆建中湯加五味子

補肺湯

一名清金湯

治丈夫婦人遠年近日脾氣欬嗽上氣

喘急喉中涎聲胸滿氣逆坐卧不安飲食不下及治肺感寒邪咳嗽聲重語音不出鼻塞頭昏並皆治之

出大全良方

罌粟殼

二兩製

人參

粉草

各半兩

陳皮

明阿膠

茯苓 杏仁 白朮 北五味子 桑白皮

薏苡仁 紫蘇莖

各一兩

右呖咀每服三大錢水一盞半薑三片棗兩枚烏梅

半箇煎至一盞臨卧溫服如加百合貝母去心半夏
麴冬花各一兩服之效

定喘湯

出永類
鈴方

治狀同前

半夏麴

炒

明阿膠

炒

甘草

各錢
半

鴛粟殼

半兩
製

北五味子

桑白皮

麻黃

去
即

人參

各一
分

右呔咀每服三大錢薑三片烏梅半箇煎至七分去

滓漸漸溫服食後臨卧服

六合湯

治肺虛作嗽喘急

紫苑

洗去土
剉碎炒

杏仁

去皮
尖

款冬花

去枚
梗子

人參

去
蘆

甘草

炙

紫蘇葉

各等
分

右咬咀每服三錢水一盞入蜜少許煎至五分食後

溫服之

人參散

出聖危
氏方

治血風勞嗽乍寒乍熱傷寒咳嗽起坐

不能

人參

知母

秦艽

款冬花

麻黃

馬兜鈴

杏仁

苦梗

寒水石

南星

地骨皮

粉草

半夏

各等分

右剉散每服三錢水一盞半麥門冬三十粒去心煎
溫服喘嗽加烏梅氣急加桑白皮

治婦人血氣勞嗽

出經驗良方

猪牙皂角

四兩蜜製

馬兜鈴

天門冬

麥門冬

去心

百部

知母

炒

麻黃

去節甘草

炙蒼朮

各一兩

右為末每服二錢空心陳米飲下

溫金散

出大全良方

治勞嗽

甘草 黃芩 桑白皮 防風 各一兩 杏仁 二十粒

人參

去蘆

茯苓

各半兩

麥門冬 一分

右以前五味二錢用米泔浸一宿晒乾次人參茯苓麥門冬三味同為細末每服二錢水一盞煎至八分

食後溫服

蛤蚧丸

出聖惠方

治婦人咳嗽不止漸成勞氣宜服之

蛤蚧

一雙酥炙

紫苑

款冬花

鼈甲

貝母

去心

皂莢子仁

各一兩炒

杏仁

炒去尖一兩半

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十九淡薑湯吞下

含化丸

出大全良方

昔有婦人患肺熱久嗽身如炙肌瘦將

成肺勞服此安寇宗爽傳此方

枇杷葉

去毛

桑白皮

款冬花

木通

紫苑

杏仁

各等分

大黃

減半

右為細末煉蜜丸如櫻桃大食後夜卧含化一九未終一劑而愈

補肺湯

出大全良方

治勞嗽

桑白皮

熟地黄

各二兩

人參

去蘆

紫苑

黃耆

川五味子

各一兩

右為細末每服二錢水一盞煎至七分入蜜少許食後溫服一方四君子湯加秦艽黃蠟煎服尤妙已上諸方辰陽李倅曾屢救人甚效服藥止可食淡煮豬蹄肉仍須煮熟肉去厚汁再以白湯熟煮仍忌房勞生冷魚腥醃醢藏寺修合煎藥忌一切生人男女猫

犬雞畜見仍不令病人知藥味大有功

治婦人室女患勞嗽百藥無效者此藥如神

出經驗良方

蛤蚧

一隻去毛蜜炙細切

絳礬

一錢煨別研入

射干

一錢水洗生用

葶麻子

半兩米炒浸炙

右為末每服一大錢水一盞生薑五片煎至八分溫服忌臧藏鮓脯之屬早晨服妙

金不換散

出危氏方

治男子女人肺胃虛寒久嗽不已喘促

滿悶咳嗽延盛腹脇脹悶腰背倦痛或虛冷嗽咳唾

紅痰及遠年日近一切喘咳疾病諸藥無效者並治之

鴛粟殼

半兩製

杏仁

製

甘草

各三錢

枳殼

四錢

右咬咀每服三錢水一盞半薑三片烏梅半個煎至八分食後臨卧漸漸熱服 許元林先生乙卯年七月僕嘗治一婦人咳嗽不已服諸藥無效漸成勞瘵永念診之六脉濡弱以愚考之此是血虛勞太過而成斯疾合用當歸等藥治之必愈遂先用橘皮湯空

心服蘇子降氣湯後用金釵煎熟地黃九當歸調理得安又治一婦人時興感熱咳嗽遂用小柴胡湯去人參薑棗只加北五味子煎即愈

黃耆散

出大全良方

治虛中有熱咳嗽膿血口苦咽乾

黃耆

四兩

甘草

二兩

右為細末湯點二錢服日三服一方甘草一兩黃耆六兩名黃耆六一湯口咬咀水煎服

貝母湯

出大全良方

治諸嗽久不差

貝母

生薑汁浸半日

北五味子

黃芩

乾薑

熟者減半

陳皮

各一兩

半夏

桑白皮

桂心

各半兩

木香

甘草

各一分

北柴胡

半兩熟者加一半

右為粗末每服五錢水一盞半杏仁七箇去皮尖碎之生薑一片煎至七分去滓熱服食稍空及臨卧各一服黃師文云戊申冬有姓蔣者其妻積年嗽製此方授之一投而差以治諸嗽悉皆愈

玉屑丸

治咳嗽延盛痰壅咽喉不利

半夏

一兩
薑製

生薑

一兩炒
片子

白礬

拈

百部

一兩
醋炙

右百部共礬為末半夏生薑同煮令爛去生薑將半夏研如泥和百部礬為丸如梧桐子大每服五十九食後臨卧薑湯送下

痰飲

附論

夫痰之為害多因外感五邪及寒暑燥濕風內傷七氣不時喜怒憂思驚恐恚因五邪而得者得風為風痰得寒為寒痰得冷為冷痰得熱為熱痰得暑為暑痰因七氣

所傷者多因婦人情性熱者不能容忍而有此證豈特
只因風冷而成哉所以外感五邪內傷七氣則一身之
中血濟淚汗涕唾身中濕者則獨變而成痰乘間而為
害也經云清則運為精華濁則凝為痰飲此之謂也然
有痰涎欬沫四種相類宜仔細詳辨調治因風而生疾
者宜服三生飲星香飲青州白丸子化痰丸因寒冷而
得者宜服降氣湯黑飲丹養正丹因熱而得者宜服金
沸草散柴胡半夏湯因暑而得者消暑丸氣不調鬱結

而成者宜服參蘇飲四七湯二陳湯痰在上者以瓜蒂
散吐之在下者以控涎丹利之雖曰可吐可下亦要觀
人之勇怯察脉之虛實方可投之初虞世有金虎碧霞
之戒者此也

關

方

旋覆花丸

出御藥院方

治停痰積飲在脇下久而不愈漸成

癖心腹脹滿羸瘦不能食雖食不消化喜睡乾嘔大

小便或澀或利腹中動搖有水聲或口乾好飲水或覺兩脇注痛服之必安久服除根

旋覆花

去梗

桂心

去皮

枳實

去穰

人參

各一兩

乾薑

炮

芍藥

白朮

各一兩

二錢半

赤茯苓

一兩

狼毒

一兩

烏頭

炮一兩

芫花

醋浸半日

橘皮

去穰

吳茱萸

湯浸去

毒炒黃

細辛

去苗

大黃

微炒

黃芩

去黑心

厚朴

去粗皮

生薑炙

亭陸

隔紙炒

七錢半

甘遂

炒半兩

礬石

火燒赤一兩

七錢半

右為末水糊為丸如梧桐子大每服三十服淡薑湯

吞下食前服

柴胡半夏湯

出永類
鈴方

治痰熱頭痛胸膈煩悶手足煩熱

榮衛

關

拘倦身體疼痛嗜卧少力飲食無

味兼治五嗽痰癖

柴胡

八兩

半夏

二兩
半

人參

去蘆

甘草

黃芩

麥門冬

各二
兩

白朮

二兩

右咬咀每服五錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至

八分去滓服

四七湯

出濟生
拔粹

治喜怒悲思憂恐驚之結成痰涎狀如

破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七氣
所為世或中脘痞滿氣不舒快或痰涎壅盛喘急或
因痰飲中節嘔逆惡心並宜服之婦人情熱者不能
寬解多被七氣所傷遂致氣損胸臆或如梅核核上
咽喉甚者滿悶欲飽產婦尤多此證宜虛服此劑間
以香附子藥久服取效切不可謂紫蘇耗氣且新產
氣血俱虛不宜多用服之效

紫蘇二厚朴三茯苓四半夏五

兩

兩

兩

兩

右咬咀每服四錢水一盞半薑七片棗一枚煎六分
去滓熱服無時候若因思慮過當小便白濁用藥吞
青州白丸子極妙

大半夏湯

出大全良方

治痰飲及脾胃不和

半夏 白茯苓 生薑

各一分

右咬咀作一服每遇膈間有寒痰以水二盞煎至一
盞去滓臨卧溫服如有熱痰加炙甘草一分如脾胃

不和去甘草加橘皮一分同煎此即二陳湯加減得理

瓜蒂

出大全良方

療病如枝證頭不痛項不强寸脉微浮胸

中痞硬氣上衝咽喉不得息者此為胸中有痰也當吐之宜服

瓜蒂

炒黃

赤小豆

各半兩

右二味同研為細末取湯七合先清之須臾煮作稀糜去滓取汁和散溫頓服不吐少少加得快吐

乃止諸亡血虛家不可與之脉微大忌令人吐

茯苓丸

出大全良方

茯苓

一兩半夏

二兩枳殼

半兩炮製

風化利硝

一分

右為末薑汁煮糊為丸如梧桐子大生薑湯下二十

丸食後服

控涎丹

出大全良方

凡人忽患胸背手足頸項腰膝隱痛不

可忍連筋骨牽引釣痛坐卧不寧時時走易不定俗

醫不曉謂之走疰使用風藥及針灸皆無益又疑是

風毒結聚欲為癰疽亂以藥貼亦非也此乃痰涎伏
在心膈上下變為此痰或令人頭痛不可舉或神意
昏倦多睡或飲食無味痰唾稠粘夜間喉中如鋸聲
多流涎涎手脚重腿冷痺氣不通誤認為癰瘰亦非
也凡有此疾但以此藥不過數服其疾如失

甘遂

去心

大戟

去皮

真白芥子

各等分炒

右為末糊丸如梧桐子大臨卧淡薑湯吞下五七丸
如疾猛加至十九

風痰 附論

夫婦人風痰者由臟腑風冷水飲停積在於胸膈所成也人皆有痰少者不能為妨多者成患胸膈有痰隱疾於五臟則令眼昏亦令頭眩頭痛也夫心胸嘈雜婦人多有此證原疾之由多是痰也皆血液淚汗變成云是血嘈今人多用猪餘血炒而食之則愈詳其此理是以血歸導血原兩恰如鹽梅下涎之義不若用旋覆花湯治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜腹鳴多睡口

中清水自出脇肋急脹悶痛不欲食此胃氣虛冷所到其脉沉遲弦細是其證也

方

旋覆花湯

出聖惠方

治婦人風痰嘔逆及中脘冷心下嘈雜

口中清水自出脇肋急脹滿痛頭目昏悶不欲食胃氣虛冷脉沉遲弦細

旋覆

去蒂 枳殼

炒 稷微

前胡

人參

去蘆

羌活

桂心

枳殼

半夏

各半兩

甘草

羚羊角屑

赤茯苓

各三分

右為粗末每服三錢水一盞薑三片煎至七分去滓

溫服

天南星丸

出聖惠方

治婦人風痰心膈壅滯

天南星

白附子

並炮

皂莢仁

炒黃

半夏麴

各一兩

晉礬

半兩枯

右為細末以酒煮麴糊丸如梧桐子大每服十九生

薑薄荷湯吞下

又方

出聖惠方

半夏

天南星

各二兩

肥皂莢

五挺

生薑

三兩

右以水五升一同煮令水淨去皂莢生薑只用半夏
天南星焙乾為末以酒煮麴糊丸如梧桐子大每服
七丸生薑薄荷湯吞下一方加白附子二兩晉礬半
兩拈

旋覆花湯

出大
良方

治婦人心胃嘈雜多是痰證或是云

血嘈今人多用餘血炒食之則愈此以血導歸原法
此湯治中脘心腹冷痰心下嘈雜口中清水自出脇

助急脹滿痛不欲食悉主之

旋覆花 北細辛 橘皮 桂心 人參 甘草

苦梗 白芍藥 半夏

各半兩

赤茯苓

三分

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑七片煎至八分去滓溫服

羚羊角散

出聖惠方

治婦人風痰氣壅心膈滿悶頭目昏重

不下飲食

羚羊角屑

二分

赤茯苓

三分

防風

半兩去蘆頭

訶梨勒皮

三分

藿香

半兩半夏

半兩湯洗七遍去滑

赤箭

半兩旋覆花

半兩芳窮

前胡

三分去蘆頭

赤草

半兩炙微赤

枇杷葉

半兩拭去毛炙微黃

枳殼

半兩麩炒微黃去穢

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓溫服不拘時候

半夏散

出聖惠方

治婦人風痰氣逆胸膈壅悶難下飲食

半夏

一兩湯洗七遍去滑

前胡

一兩去毛頭

旋覆花

半兩

大腹皮

一兩

桂心

半兩

人參

二分去蘆頭

白朮

三分

甘草

半兩炙微赤

防風

半兩去蘆頭

枳殼

半兩 麩炒
微黃去穢

桑根白皮

半兩 剉

陳橘皮

半兩 湯浸
去白穢焙

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓溫服不計時候

赤茯苓散

出聖
惠方

治婦人風痰心胸不利頭目昏重時欲

嘔吐不下飲食

赤茯苓

一兩

蔓荊子

半兩

細辛

半兩

人參

三分
去蘆

前胡

一兩 去
蘆頭

白朮

半兩

枇杷葉

三分 拭去
毛炙微黃

芫花

三分

半夏

半兩 湯洗
七遍去滑

陳橘皮

半兩 湯浸
去白穢焙

防風

半兩 去
毛頭

甘草

半兩 炙
微赤判

右為末每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓溫服不拘時候

皂莢煎丸

出聖惠方

治婦人風痰

皂莢

一枚細剉去子用水七升漾後取寸於銀鍋中煎熬如膏

人角星

二兩炮製

防風

二兩去蘆頭

天麻

二兩

旋覆花

二兩薄荷乾者

右為細末入前煎中拌和為丸如梧桐子大每服十

丸生薑湯下不計時候

又方

出聖惠方

治婦人風痰

白礬

一兩通明者生用

朱砂

一兩研細水飛過

右同研勻以水浸蒸餅和丸如菉豆大每服五丸薄荷湯下不計時候

喘滿

附論

黃帝問岐伯對曰夜行則喘出於腎淫氣病肺有所墮恐喘出於肺淫氣言脾有所驚恐喘出於肺淫氣傷心度水跌仆喘出於腎與骨是之當時勇者乞行則以怯者則着而為病也原疾之由雖曰皆本於肺與氣然感

外射則有太陽證脉浮無汗而喘者宜麻黃湯陽明並汗出惡不寒腹滿而喘有漸熱者宜承氣湯者表邪未解誤服下利藥利不止促喘而汗出者宜葛根黃芩湯微喘者桂枝厚朴杏仁湯汗出喘若無大熱宜麻黃否子甘草石膏湯若表邪未解心下停水發熱而或嘔者青龍湯去麻黃加杏子主之若陰證喘促者四肢逆冷脉息沉細或寸大尺小或六脉促疾或心下腹滿結硬或冷汗自出或大便頻數上氣喘促或咽喉不利者此

是本氣極虛內外挾寒冷所致使陰寒內消伏陽氣得
腹則愈宜返陰丹主之大槩諸臟同乘而喘者以杏子
散如感寒伏熱而喘者以葦蓋散九寶湯若暴寒冷覆
衣被過當腹熱肺實而喘促者其狀多有熱證宜洗心
散冷水調服若因氣宗不調痰盛喘促者宜四七湯無
官局桔梗薑湯煎服若涎多而喘者宜千緡湯橘皮半
夏湯若不卧卧即喘者此由水氣逆行上乖於肺中或
在右脇下大如杯令人灑淅寒熱喘發癰疽宜棗膏丸

若於上焦得水則浮而開使氣不得通流六脉大宜神
祕湯肺之積名息賁上氣喘者宜神授湯若上盛下弱而喘
促者宜蘇子降氣湯吞黑錫丹若尊年之人素來稟賦
太厚不任熱藥者不可輕投丹劑及諸熱藥但以祕傳
降氣湯分心湯氣飲論之梗槩不出於此若素有腳氣
而喘者當作腳氣治之又有骨蒸勞喘治之別有法

夫促者脚病者肺為主五臟六腑皆稟氣於人喜怒
太過不節動肺氣實則上喘虛則氣跌然有娠者經水

不通上榮於乳下養於胎若宿有停飲與血搏後冷熱
不調動其血飲上達故胸膈悶而嗽產後喘者榮血暴
竭衝氣無主攻肺故喘促過在產時漏下太過此名有
陽絕患難以喘論宜服六合湯若因惡露發喘先與琥
珀散後與喘藥服之

方

九寶湯

出聖惠方

治感風伏熱一切咳嗽喘急不問高年小

兒室女婦人產前後皆可服惟虛勞自汗不可服

薄荷葉

紫蘇

大腹皮

洗

麻黃

去穢節
各四錢

桑白皮

桂心

杏仁

去皮
尖

陳橘皮

甘草

各二
兩半

右咬咀每服半兩水一盞半薑十片烏梅一箇煎至

六分去滓溫服食後服一方加鴛粟殼二箇人參少

許有兩浙張大夫病喘二十年每冬輒劇不可坐

卧百方不瘥後得臨平謂法本服之遂瘥法本凡病三

十年服此藥半年乃絕根本永不復發凡服此藥須

久乃瘥

神祕湯

出大全良方

治水氣乘肺而喘兼療支飲而喘

陳橘皮

洗去白

紫蘇葉

人參

桑白皮

生薑

各等分

右咬咀每服半兩水煎去滓溫服

神授湯

出大全良方

治上氣喘急不得卧

橘皮

苦梗

紫蘇

人參

北五味子

右各等分咬咀每服四錢水一盞煎六分去滓食後服

千緡湯

出大全良方

治痰喘

齊川半夏

七個炮製
四片炒之

皂角

去皮尖
一寸

甘草

炙一
寸

生薑

如指
大

右同以水一煮去滓半碗頓服沈與宗待制常病痰喘不能卧人扶而坐數日客有見之曰我曾如此得良藥一服瘥我以千緡酬之謂之千緡湯可試為之與宗得湯一服而瘥

棗膏丸

出大全
良方

療息賁

葶藶

研細

陳皮

苦梗

右後二味為末入葶藶令停煮肥棗內研為膏和九
如梧桐子大每服五七丸飲下許學士云予嘗患停
飲水積肺經食已必噎漸喘覺肺系急服此良驗

杏子散

出大全良方

治諸臟相乘喘急

杏子仁

去皮尖雙仁麩炒黃細研如骨

麻黃根

為細末等分

右和煎橘皮湯調下二錢無時候

治婦人喘促虛腫快利小便即瘥

用生薑二兩取汁白麩三兩以薑汁搜作小劑大半

夏十個打研入麪中作七餅炙熟作黃色為末溫熱水調下一錢以小便通利為度

天門冬丸

出楊氏家方

治婦人喘急手足煩熱骨蒸寢汗口

乾引飲面目浮腫

天門冬

十兩去心秤

麥門冬

八兩去心

生地黄

三斤取汁為膏子

右二味為末膏子和丸如梧桐子大每服五十九煎逍遙散送下散中去甘草加人參或服王氏博濟方中人參荊芥散亦可如面腫不已經旦面腫惡風故

宜汗麻黃桂枝可發其汗後服柴胡飲子去大黃故論
曰治臟者治其俞治腑者治其合乳腫治其經治俞
者治其土也治合者亦治其土也如立家國魏救趙
之法也

嘔吐 附論

夫婦人嘔吐者由脾胃有邪冷穀氣不理為之也胃為
水谷之海其氣不調而有風冷乘之冷搏於胃胃氣中
逆則令嘔吐凡嘔吐之疾非特脾胃虛冷而嘔吐也亦

有胃熱而嘔者亦有中冷胃口熱而吐者亦有痰盛而嘔者亦有血弱而喘者經云無陰則嘔是也不可以一槩用藥如胃冷而嘔吐宜用局方人參丁香散理中九及許則仁半夏九人參七味九如胃熱而嘔吐者宜用小柴胡湯盧根湯竹茹湯槐花散如胃中冷胃口熱而嘔吐者宜局方藿香正氣散生薑棗子煎俟冷服即止如痰盛嘔吐者宜局方半夏茯苓湯二陳湯如惡阻兼服茯苓九如血不歸原而嘔者宜用十全大補湯加陳

皮半夏藿香棗薑煎服凡嘔吐者飲食不時生冷過度
致使脾胃不和氣逆嘔吐與無礙丸五物湯主之之類
或咽喉不通經絡澀滯四肢浮腫而吐不能止則為胃
虛也宜與五物湯妊娠而嘔吐經血既閉水積臟腑氣
不宣通故心煩憤悶閉食不美喫食無味飲啖酸菓脇
滿嘔吐此名惡阻胎氣上衝故也五物湯主之產後中
惡嘔吐因其血損其氣虛其臟腑感其風寒則脾胃虛
冷而嘔吐五物湯加半夏主之凡滯下病之稍久或

欲愈之時多有咳逆及嘔逆之證然咳逆者古人所謂
噦是也噦者胃寒所生此證最危其他病亦惡欬逆如
見此證宜用橘皮乾薑湯下半夏生薑湯丁香柿蒂湯
若陽證欬逆者小柴胡湯橘皮竹茹湯嘗治一痢疾欬
逆不止六脉沉弱諸醫用藥灼艾皆無效僕投退陰散
兩服愈又嘗治許主簿痢疾愈後咳逆不止服諸藥無
效遂灸期門穴三壯而愈如有嘔逆之證雖經云無陰
則嘔然多有胃熱而嘔亦有胃寒而生有暑毒而生如胃

熱而嘔宜服小柴胡湯孫兆竹茹湯蘆根湯官局桔梗湯竹葉石膏湯加生薑主之嘔而發消者猪苓湯又嘗治一痢疾後嘔不止六脉虛弱此胃寒而嘔又似暑毒壅於胃脘投局方香薷散愈

方

益母子散

出聖惠方

治婦人脾胃久虛氣弱多欲嘔吐全不

飲食四肢少力

益母

一兩

附子

炮

縮砂仁

丁香

厚朴

白茯苓

黃耆 白朮 陳皮 川芎 良薑 藿香葉

當歸

各三分

人參

桂心

各半兩

右咬咀每服三錢薑三片棗三枚水一盞煎至七分去滓無時溫服一方加白豆蔻半兩甘草半兩

厚朴丸

出聖惠方

治婦人胃冷嘔吐不下食

厚朴

去粗皮生薑汁炒三兩

右以薑汁一升水五合煮令汁盡焙乾為末以酒和神麴為丸如梧桐子大每服三十九不拘時溫酒下

白豆蔻散

出聖惠方

治婦人脾胃氣弱時欲嘔吐

白豆蔻

三分去皮

芳藹

半兩

丁香

半兩

藿香

半兩

白朮

一兩

木香

訶梨勒皮

各半兩

厚朴

一兩

去粗皮塗薑汁炙香熟

半夏

半兩

洗七次

白茯苓

半兩

桂心

半兩

附子

半兩

炮製去皮臍

高良薑

半兩

劉

陳橘皮

三分

湯浸去白穰焙

甘草

半兩

炙微赤劉

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓溫服不拘時候

七香丸

出聖惠方

治婦人脾胃氣弱腹脹嘔吐不納飲食

沉香

分三

麝香

研入一分細

白檀香

分三

藿香

分三

丁香

分三

零陵香

分三

檳榔

兩半

白芷

兩半

訶梨勒皮

分三

芫窮

分三

白豆蔻

微一兩

桂心

分三

附子

兩半

當歸

碎微炒

細辛

分三

木香

分三

右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服二十丸生薑湯嚼下不計時候

白朮丸

治婦人脾胃氣虛弱腹中冷痛時復嘔吐不

能下食四肢少力

白朮

一兩

木香

半兩

訶梨勒皮

半兩

當歸

半兩

碎微炒

桂心

半兩

芫薺

半兩

青橘皮

三分

湯浸去白穢焙

附子

一兩

炮製去皮臍

蓬莪茂

人參

各半兩

去蘆頭

厚朴

三分

去粗皮生薑汁炙令香熟

甘草

一分

炙微赤剉

吳茱萸

半兩

湯浸七遍焙乾微炒

乾薑

半兩

炮製

右為末酒煮麴糊和搗三五百杵丸如梧桐子大每

服二十九棗薑湯下不計時候

茅香花散

治婦人脾胃氣逆或時嘔吐不思飲食四

肢乏力

茅香花

一兩

厚朴

一兩

薑汁炙

令香熟

丁香

半兩

藿香

三分

高良薑

半兩

陳橘皮

一兩

湯浸

訶梨勒皮

半兩

當歸

三兩

附子

各半兩

炮製去皮臍

人參

半兩

白朮

一兩

甘草

半兩

炙微赤

桂心

半兩

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓稍熱服不拘時候

訶梨勒散

治婦人脾胃氣逆胸中痰滯時欲嘔吐不

思飲食

訶梨勒皮

一兩

草豆蔻

二兩 去皮

陳橘皮

一兩 湯浸 去白穰焙

白朮

高良薑

各三分 剉

厚朴

一兩 去粗皮 塗薑炙令香熟

半夏

半兩 湯浸 七遍 去滑

白茯苓

三分

桂心

半兩

人參

三分 去蘆頭

附子

三分 炮製 去皮臍

甘草

半兩 炙 微赤剉

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓熱服不計時候

龍腦散

治婦人脾胃虛弱胸膈氣滯吐逆不止

白龍腦

一分 研入

訶梨勒皮

半兩

人參

一兩 去蘆頭

丁香

半兩

肉豆蔻

半兩
去殼

藿香

半兩

茅香花

半兩

沉香

三分

甘草

一分炙
微赤判

右為散研入龍腦令勻每服一錢溫酒調下生薑粥

飲亦得不計時候

草豆蔻散

治婦人脾胃虛冷胸膈不利食即嘔吐

草豆蔻

一兩
去皮

沉香

半兩

白豆蔻

半兩
去皮

白朮

半兩

桂心

半兩

訶梨勒皮

半兩

丁香母

半兩

甘草

一分炙
微赤判

右為細散每服一錢生薑調下不計時候

開胃丸 治婦人吐血不止

半夏

三兩湯浸去皮塗生薑用搗令爛焙乾

白豆蔻

一兩去皮

白朮

一兩

人參

一兩去蘆頭

陳皮

一兩湯浸去白穢焙

右為細末生薑汁煮棗肉和搜為丸如梧桐子大每

服三十九粥飲下不計時候

丁香散

治婦人臟腑虛冷脾胃氣弱食則嘔吐水穀

不消

丁香

白朮

縮砂仁

草菓仁

各二分一作草豆蔻

當歸

人參

一兩白豆蔻

藿香葉

甘草

二分橘皮

三分

神麴

訶子

各半兩

右為細末每服二錢用煎薑棗湯調下

半夏丸

療積冷在胃嘔逆不下食

半夏

一升真熊州者洗去滑

小麥麴

一升

右搗半夏為散以水搜麴丸如彈子大以水煮令麴熟則是藥成初吞四五丸日二服稍加至十四五丸旋服比覺病減欲更重合服亦佳忌羊肉鰾救急用人參七味丸此藥服前半夏丸雖覺漸損然病根不

除欲再服之又慮藥毒不可久服恐病滋蔓者宜服

人參 白朮

各五兩

厚朴

炙

細辛

各四兩

生薑

八兩末

橘皮

三兩 桂心

二兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大米飲下十九漸加至二十九與半夏九間服亦可忌桃李雀肉生葱生菜

槐花散

治胃熱嘔吐

皂莢

白礬

槐花

炒令黃
共黑色

甘草

各等分

右為細末白湯調二錢

竹茹湯 治胃熱嘔吐

乾葛

三兩

半夏

湯洗七次薑汁半盞漿水一升煮合耗半可取三分用

甘草

三分

右咬咀每服五錢水二盞薑三片竹茹一彈大棗一枚煎至一盞去滓溫服胃熱者手足心熱昔有一人病傷寒得汗身涼數日忽嘔吐藥與飲食俱不下進丁香藿香滑石等藥下咽即吐謂此正汗後餘熱留胃脘孫兆竹茹湯正相當耳

橘皮乾薑湯

出大全良方

橘皮 通草 乾薑 桂心 甘草 各四兩 人參 二錢

右咬咀每服四錢水一盞煎至七分去滓溫服

生薑橘皮湯 治乾嘔噦若手足厥冷者

橘皮 四兩 生薑 半觔

右咬咀每服半兩水一盞煎至七分去滓溫服

橘皮竹茹湯 出大全良方 治噦逆

橘皮 二兩 竹茹 一升 甘草 二兩 人參 半兩 半夏 一兩 湯洗

右咬咀每服四錢水二盞生薑六片棗一枚煎至七

分去滓溫服金匱方無半夏

治嘔逆氣亂心煩

右以乾柿一箇水二盞煮呷神效

猪苓湯

出大全良方

治咳而嘔渴心煩不得眠

猪苓

赤茯苓

澤瀉

阿膠

炒滑石

各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞煎後膠消盡服

丁香柿蒂湯

出大全良方

治吐咳逆

丁香

一十粒

柿蒂

一十五箇

右吹咀用水一盞半煎至八分去滓熱服

半夏生薑湯 治噦欲死

半夏

二兩一分洗

生薑

二兩切

右以水二盞煎至八分去滓分為二服

白堊散

出大全良方

治婦人翻胃吐食及治男子

白礬土

以米醋一升煨白礬土令赤入醋內浸令冷再煨再浸以醋乾為度取一兩研

乾薑

一分炮

右為細末研停每服一錢飯飲調下甚者二錢如服

一觔以上取效

白芷散

出大全良方

治婦人翻胃吐食

右用白芷一兩切作片於瓦上炒令黃為細末用猪血三十文切片以沸湯泡七次將血蘸藥喫七片如刺藥末留後次用

心腹脹滿

附論

夫婦人心腹脹滿者臟腑久冷氣血虛損而邪氣客之乘於心脾故也足大陰脾之經也脾虛則脹足少陰腎

之經也其脉起於小指之下斜趣足心入跟中上眼內
後兼貫腎絡膀胱從腎上貫肝膈入肺中其支者從肺
出絡於心臟虛邪氣客於三經與正氣相搏積聚內外
氣并於脾脾虛有脹故令心腹煩滿而脹也診其脉遲
而滑者脹滿也胸腹脹滿者由體虛風冷之氣客於腸
胃搏於心腹氣血壅滯不能宣通得冷則逆上搶胸腹
故令腹滿緣腹中故有停宿冷因冷胎氣相干是故腹
脹產後兩脇或腹脹妨悶膀胱有停宿水因產而惡露

不盡二物相雜流於胃故使然也脹悶之疾龍涎湯降
氣主之 夫婦人胸脇脹滿者由勞傷體虛而風冷之
氣乘之客於臟腑腸胃之間搏於血氣血氣壅之不宜
氣得冷則逆與血相搏則上搶胸脇脹滿也

方

訶梨勒散

出聖惠方

治婦人心腹兩脇脹滿不思飲食四肢

少力

訶梨勒

三分
用皮煨

吳茱萸

半兩湯浸七
次焙乾微炒

人參

半兩去
蘆頭

半夏

半兩湯洗七遍去滑

陳橘皮

三分湯浸去白穰焙

桂心

三分

木香

半兩

當歸

三分剉微炒

白朮

三分厚朴

三分去粗皮塗生薑汁炙香熟

甘草

一分炙微赤剉

桃仁

三分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓溫服不計時候

阿魏丸

出聖惠方

治婦人臍氣久虛腹脹不能食

阿魏

三分

木香

一兩

檳榔

一兩

肉豆蔻

半兩去殼

當歸

一兩剉微炒

剉

陳橘皮

三分湯浸去白穰焙

訶梨勒

一兩煨去皮用

桃仁

三兩湯浸去皮尖雙仁研如膏

丁香

半兩

附子

半兩製去皮臍

桂心

白朮

三分

右為末同童子小便煎阿魏桃仁成膏另溫同入煎藥末和擣五百杵丸如梧桐子大不計時候溫生薑

酒下二十丸

檳榔散

出聖惠方

治婦人稟賦實熱心腹脹滿不欲飲食

檳榔

前胡

川芎

青皮

各三分

赤芍藥

桂心

大黃

苦梗

木香

枳殼

各半兩

右為咀咀每服四錢薑三片煎至七分去滓溫服無

時候

鼈甲散

出聖惠方

治婦人血氣壅滯心腹脹滿攻背膊疼悶

鼈甲

一兩塗醋炙令黃去裙襴

赤芍藥

枳殼

麩炒微黃去穢

芎藭

各半兩

赤茯苓

一兩剉微炒

甘草

一分炙微剉

桃仁

半兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

木香

半兩剉

三稜

三分微剉

陳橘皮

三分湯浸去白穢焙

川大黃

一兩剉微炒

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分去滓每於

食前溫服

白朮散

出聖惠方

治婦人脾胃氣虛心腹脹滿不欲飲食四

肢少力

白朮

草蓂仁

亦作草豆蔻

訶子肉

各三分

檳榔

桂心

赤茯苓

各半兩

陳皮

厚朴

人參

各一兩

甘草

右為粗末每服四錢水一中盞入薑三片棗一枚煎至七分去滓食前熱服

木香散

出聖惠方

治婦人脾胃虛冷心腹脹滿不欲飲食

木香

桂心

白朮

乾薑

炮

陳皮

訶梨勒

草薺仁

亦作草
豆蔻

人參

各一兩

神麴

炒黃
二分

甘草

炙半兩

右為細末每服一錢如茶點熱服

檳榔散

出聖
惠方

治婦人臟腑氣滯心腹脹滿不能飲食

檳榔

一兩

桔梗

三分去
蘆頭

桂心

一兩

陳橘皮

三分湯浸
去白穰焙

鼈甲

一兩塗醋炙
令黃去裙襴

枳殼

三分麩炒微
黃去白穰

當歸

半兩剉
微炒

川大黃

一兩剉
碎微炒

桃仁

一兩湯浸去皮
尖雙仁麩微炒

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分棗三枚煎

至六分去滓溫服不計時候

胡椒丸

出聖惠方

治婦人脾胃久冷心腹虛脹面無顏色四

肢羸瘦不思飲食

胡椒

一兩桂心

三分炮

芫薺

二分當歸

三分剉微炒

高良薑

一兩剉

附子

一兩炮製去皮炒

木香

半兩

草豆蔻

一兩去皮

白朮

三分

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大不計時候熱酒下三十丸

龍涎湯

治心腹脹悶嘔吐不思飲食噎塞

沉香

木香

各一錢不見火

人參

四錢不見火

甘草

二錢炙

丁香

四錢不
見火

烏藥

六錢
陳皮七錢
去穢浸

無礙丸 治心腹脹滿嘔逆酸水

大腹皮

檳榔

炮

三稜

各半
兩炮

莪朮

一兩
炮

木香

半兩不
見火

右為細末以糊為丸如梧桐子大每服五十九用橘皮湯下不拘時候又呔咀白水煎至七分熱服

五物湯 治心腹脹滿送食不下

木香

二錢半
不見火

檳榔

炮

白朮

製朴

甘草

各三錢

右呔咀每服五錢水二盞入紫蘇葉七片鹽半錢煎

至七分熟服不拘時候

降氣九 治心腹脹悶不下飲食

枳殼

去穢炮

橘皮

去穢各二兩

木香

三錢半

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九用薑

蔔湯食後下

檳榔散

出聖惠方

治婦人血氣攻心胸膈氣滯腹脇虛脹

檳榔

半兩

當歸

一兩剉微炒

桂心

半兩

木香

半兩

赤芍藥

一兩

吳茱萸

一分湯浸過焙赤微炒

青橘皮

一兩湯浸去白穢焙

右為細散不計時候熱酒調下一錢

大黃丸

出聖惠方

治婦人心胸氣壅兩脇滿悶不能飲食

川大黃

一兩剉碎微炒

桂心

半兩枳殼

三分麩炒微黃去穰

柴胡

一兩去皮炮

訶梨勒

一兩煨用皮

桔梗

一兩去蘆頭

右為散每服四錢水一中盞入生薑半片煎至六分去滓溫服不計時候

人參紫金丸

出大全良方

治婦人榮衛不和心腹刺痛胸膈

脹滿不思飲食

紫金皮 蒼朮 石菖蒲 香附子二兩 人參半兩

木香三錢

右為末蜜米糊和丸如梧桐子大每服三十九食後

薑湯下

兩脇脹痛 附論

夫婦人兩脇脹痛者由臟腑虛弱氣血不調風冷之氣客於腹胃復於胞絡之間與血氣相搏壅塞不宣邪氣交爭擊故令兩脇脹痛也

方

三腕散 治中焦虛痞兩脇氣痛面目手浮足腫大便

秘澀兼治脚氣

大腹皮 紫蘇 沉香 乾木瓜 獨活

各一兩

白朮 川芎 木香 甘草 陳皮 檳榔

各三兩

右以咀每服三錢水一盞煎至七分去滓空心熱服
日中服大承氣方亡昔有一婦中焦虛痞腸脇脹痛
大便秘結六脉虛弱更數醫服藥無效僕投此藥不

數劑而愈

訶梨勒皮 治婦人心腹氣滯兩脇脹痛四肢無力不

思飲食

訶梨勒

一兩煨用皮

檳榔

桂心

木香

各半兩

赤芍藥

白朮

桔梗

去蘆頭

當歸

剉微炒各三分

芍藥

半兩

陳橘皮

一兩湯浸去白穢焙

鼈甲

一兩塗醋炙令黃去裙襴

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分煎至六

分去滓溫服不計時候

枳殼九 治婦人心腹氣滯兩脇脹痛不能飲食

枳殼

三分麩炒黃去穢

檳榔

一兩

桂心

三分

木香

半兩

芳藟

半兩

鼈甲

一兩塗醋炙令黃去裙襴

吳茱萸

半兩湯浸七遍焙乾微炒

當歸

半兩剉微炒

訶梨勒皮

三分

川大黃

一兩剉碎微炒

陳橘皮

三兩湯浸去白穢

右為細末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服

煖酒下三十九

草豆蔻散

治婦人脾胃虛氣攻兩脇脹痛

草豆蔻

訶子肉

各一兩

桂心

桔梗

厚朴

各三分

甘草

一分 川芎

當歸

乾薑

檳榔

各半兩

右為粗末每服四錢水一盞煎至七分去滓熱服食

前

菴藺子散

治婦人臟腑虛冷宿食氣攻兩脇脹痛坐

卧不安

菴藺子

延胡索

桃仁

桂心

琥珀

當歸

赤芍藥

木香

沒藥

各半兩

右為末每服二錢溫酒調下無時候

木香散 治婦人血氣攻兩脇脹痛背膊壅悶手足煩
疼不能飲食

木香

分三

白朮

兩一

桂心

訶梨勒皮

分三

赤芍藥

川大黃

當歸

微炒

三分剉

鼈甲

令黃去裙襴

一兩半塗醋炙

桃仁

雙仁

三分湯浸去皮尖

微炒

微黃

右為散每服四錢水一中盞入生薑半分煎至六分
去滓不計時候溫服

木香散

治婦人胃膈氣壅兩脇脹悶不欲飲食

木香

半兩

枳殼

一兩

微黃去穢

炒

川大黃

一兩

剉碎微炒

白朮

三分

前胡

一兩

去蘆頭

赤茯苓

三分

桂心

三分

訶梨勒

一兩

用皮

煨

大腹皮

半兩

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分

不計時候分溫服

木通散 治脇肋苦痛甚效併心下脇肋并小腹牽引

痛者皆主之及治心下脇肋小腹疼痛皆素有積寒

而溫煖湯散亦可主治甚者以溫藥下之心下與小

腹痛諸書並有效方脇肋下痛鮮獲治法

木通

青皮

去白

川練子

去皮核

各一兩已上三味用巴豆一兩炒黃去豆

蘿蔔子

炒

舶上茴香

一兩炒

莪朮

木香

滑石

各半兩

右為細末煎葱白酒調三錢一服愈甚者不過再服

木香散

治婦人虛冷氣攻兩脇脹痛不能飲食

木香

一兩

吳茱萸

半兩

湯浸七遍焙乾微炒

芎藭

三分

桂心

三分

高良薑

半兩剉

當歸

三分剉微炒

桃仁

三分

湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

右為細末不計時候熱酒調下二錢

靈寶散 治婦人氣攻刺痛引兩脇並治瘰癧冷氣

丁香 木香 乳香 各錢半 當歸 玄胡索

白芍藥 各半兩

右為末每服一錢溫酒調服食前

芍藥湯 出危氏方 治冷證脇痛諸藥不效

香附子 四兩黃子醋二升 肉桂 延胡索 炒

白芍藥 各一兩

右為末每服二錢沸湯調不計時候服一婦人年八

十忽兩脇痛愈

氣針九

出大全良方

治久積風壅疎利滯氣寬胸膈止刺痛

黑牽牛

二兩半生半炒

木香

青皮

去白

大黃

炮

檳榔

各一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大溫水下三十丸 大全

良方云昔有鄧安人年五十忽然氣痛投神保丸愈

不一二日再痛再服神保丸六十七粒大腑不通其

疾轉甚亦有要用沉香木香薑桂等藥而未敢投痛

甚則築心築背定兩脇似有兩柴十字插定心脇叫

聲徹天召僕診之六脉沉伏乍來乍去衆問僕診脉
吉凶何如荅曰夫凡痛之脉不可準也但以證辦用
藥觀其肌體肥偉問其大腑數日不通僕曰實痛也
其腹必脹但以人按之痛甚手不可向逆此大實也
經云滿大實者可不之用氣針九五六百粒是後即
愈 又金陵有家提幹闕 內人病心腹脹痛

醫家投木香沉香檳榔大腹芍藥薑桂之類病益甚
召僕診之六脉弦緊而和不似病脉但診時手如火

以此知其實痛也衆問如何治療僕曰大凡心腹刺痛不可便作虛冷治之有二醫荅曰非冷而何熱即生風冷生氣是也僕曰不然難經云虛作痒實則痛文通景云腹痛者用甘草芍藥湯痛甚者附子乾薑湯家提幹云荆布素來質弱僕曰有可辨處遇痛時使一婢按之若痛止是虛寒証也若按之轉甚手不可近此實痛也令一婢按之手不可近叫喚異常僕曰此實熱無可疑者當用大柴胡湯治之衆皆不許

僕責狀而投之八服愈逍遙亦妙



普濟方卷三百二十